DMLA: une vue d'ensemble

Salomon Yves Cohen

Centre d'Imagerie et de Laser, Paris Université Paris Est, Créteil





- Retentissement psychologique
- · Craintes exprimées ou non-dites
- Erreurs psychologiques
- · Quelques conseils

Retentissement psychologique Pubmed : age related macular degeneration quality of life 578 références

Brown 2006: The quality-of-life loss associated with macular degeneration is markedly underestimated by the general public, nonophthalmic physicians, and ophthalmologists who treat patients with this condition.

Brown 2006:


Moderate AMD causes a 40% decrease in the average patient's quality of life, similar to that associated with severe cardiac angina or renal dialysis.


Very severe AMD causes a large 63% decrease in the average patient's quality of life, similar to that encountered with end-stage prostatic cancer or a catastrophic stroke that leaves a person bedridden, incontinent and requiring constant nursing care.

Retentissement psychologique

Dans mon expérience

Le retentissement est extrêmement variable





Retentissement psychologique

Dans mon expérience

Le retentissement est extrêmement variable

Facteurs influençant ce retentissement

« Nature, Caractère »: optimiste, pessimiste
Confiance en la médecine (et en l'avenir)
Qualité de l'entourage
Etat général du patient: Maladies intercurrentes et handicaps
associés

Retentissement psychologique

Dans mon expérience

Le recours au généraliste, au psychologue ou au psychiatre s'impose en cas:

- d'idées suicidaires exprimées
- de prostration
- de non écoute devant des arguments positifs répétés

- Retentissement psychologique
- · Craintes exprimées ou non-dites

Tout patient atteint de maladie des yeux craint la cécité

La persistance du champ visuel, quelle que soit l'évolution de la maladie, doit être répétée régulièrement, éventuellement à chaque consultation

Tout patient âgé craint la dépendance

Détailler ce que la maladie peut faire perdre mais aussi ce qu'elle ne peut pas faire perdre

- Retentissement psychologique
- · Craintes exprimées ou non-dites
- Erreurs psychologiques


Erreurs psychologiques


Parler à l'entourage plutôt qu'au patient:


Infantiliser, c'est renforcer la crainte de la dépendance


Erreurs psychologiques

Parler à l'entourage plutôt qu'au patient Sous-estimer la maladie









Erreurs psychologiques

Parler à l'entourage plutôt qu'au patient Sous-estimer la maladie:

Risques: hématome, déchirure de l'EP, fibrose

Erreurs psychologiques

Parler à l'entourage plutôt qu'au patient Sous-estimer la maladie Banaliser l'IVT:

- Douleurs
- Complications

Erreurs psychologiques

Parler à l'entourage plutôt qu'au patient Sous-estimer la maladie Banaliser l'IVT Focaliser l'entretien sur la thérapeutique

- Retentissement psychologique
- · Craintes exprimées ou non-dites
- Erreurs psychologiques
- · Quelques conseils

· Quelques conseils:

En quelques phrases d'entretien: Apprécier la vie quotidienne du patient Comprendre sa demande si elle n'est pas exprimée

· Quelques conseils:

Laisser parler des craintes pour les dissiper Discuter de vos changements d'option thérapeutique et de votre stratégie

Toujours laisser la porte ouverte aux innovations scientifiques (et donc à l'espoir d'amélioration)



Le vieillissement est un défi médical, social et sociétal La prise en charge de la DMLA impose de garder conscience des problématiques multiples du vieillissement



Garder à l'esprit son retentissement psychologique De toutes les choses imprévues, la plus mal préparée reste la vieillesse