Vision And
Handicaps
ÎLE-DE-FRANCE

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
PITIÉ SALPÊTRIÈRE
CHARLES FOIX

Vascularites rétiniennes non infectieuses

DU Imagerie et Pathologies rétiniennes

11 septembre 2023

Dr Adélaïde Toutée, Dr Emilien Faudi, Dr Terrada, Dr Sarah Mrejen, Pr Michel Paques, Pr Bahram Bodaghi
DU organisé par Dr Couturier, Pr Tadayoni, Pr J Sahel, Pr Michel Paques, Pr Alain Gaudric
adelaide.toutee@aphp.fr

Vascularites rétinienne

Infectieuses

Non Infectieuses

Maladies virales

Herpès virus (HSV, VZV, CMV, EBV)
autres : VIH, HTLV1, West Nile ...

Maladies bactériennes

Tuberculose
Syphilis
Lyme
Bartonella
Whipple
Rickettsiose, brucellose, leptospirose

Maladies parasitaires

Toxoplasmose
Toxocarose
autre

Maladies Ophtalmologiques

Maladie de Eales
Choriorétinopathie Birdshot
Syndrome IRVAN
Pars planite
Ophtalmie sympathique
Choroidite multifocale

Vascularite rétinienne
idiopathique

Maladies Systémiques

Maladie de Behçet
Sarcoïdose
Sclérose en plaques

Susac
MICI
HLA B27
Vascularites, Lupus, SAPL

Importance de l'imagerie multimodale dans la CAT

Artères

Veines

Capillaires
rétiniens

Vascularites
rétiniennes

Diffusion
angiographique

Vasculites
cicatricielles

Vascularites
rétiniennes

Oedème
maculaire

Non perfusion
rétinienne

Orientation étiologique

Principales étiologies en fonction des atteintes rétiniennes

Fond d'œil	Diagnostic
Veines	Behçet, Sarcoïdose, SEP BK
Artères	Vascularites (GPA, CSS, Takayasu...), Lupus, SAPL, SUSAC, IRVAN Nécrose rétinienne aiguë
Infiltrats réiniens	Behçet
Foyers réiniens	Behçet Infections (toxoplasme, HSV, syphilis...)
Ischémies réiniennes	Behçet >> SEP, sarcoïdose
Occlusions veineuses	Behçet, sarcoïdose BK
Occlusions artérielles	Lupus, vascularites systémiques, SUSAC, toxoplasme

Bilan

Vascularite rétinienne

Infectieuses

- Terrain, Contage ou ATCD BK
- Clinique
- Sérologies $\pm$ PCR Herpes virus, toxoplasmose, TPHA-VDRL, VIH, Lyme, QF $\pm$ IDR, hémocultures. (Puis Whipple, Rickettsiose, brucellose...)
- PCA (bactério, mycobactério, viro, parasito)
- **Vitrectomie (Whipple, LNH)**

Non Infectieuses

- Clinique+++
 - ECA, BGSA, Calcémie
 - HLA B27, HLA A29
- AAN, aPL, aB2gp1, ACC, ANCA, cryo, complément

TDM thorax
PL
IRM SNC (BD, BBS, SUSAC, SEP, LNH...)
+/- endoscopies...

TOUJOURS ELIMINER en 1er

- ❑ **Etiologie infectieuse+++**
- ❑ **Lymphome intra-oculaire et autre processus tumoral**

Vascularite rétinienne non infectieuse

OCULAIRE PURE

1

FA: papillite et une vasculite des grands vaisseaux et des petits vaisseaux rétiniens

ICG nombreuses zones hypofluorescentes aux temps intermédiaires
Mieux visibles qu'en FA

HLA A29

Rétinochoroidopathie de Birdshot

- Caucasien, Femme 54,1%
- 35-70 ans
- Très forte corrélation HLA A29+ (95,7%)
- Critères UCLA 2006 :
 - ✓ atteinte ODG, ≥ 3 lésions choroïdiennes typiques, tyndall vitréen ant $\leq +1$, hyalite $\leq +2$
 - ✓ HLA A 29 +, Vascularite rétinienne, Œdème maculaire
 - x Critères d'exclusion : PRC, SIC et autre cause de choroïdite (MAI, infection)

Atteinte indépendante de la rétine et de la choroïde

IRVAN

« Idiopathic retinal
vasculitis, aneurysms, and
neuroretinitis »

Décrit la 1^{ère} fois Kincaid
et Schatz 1983

IRVAN

Idiopathic retinal vasculitis, aneurysms, and neuroretinitis

- Femme jeune++
- Idiopathique
- Principalement : - Dilatation anévrysmales multiples
 - Vascularite rétinienne à la bifurcation des artères
 - Neurorétinite
- En 2nd plan: - Trouble perfusion capillaire périphérique
 - Néovascularisation rétinienne
 - Exsudation maculaire

Stade de gravité

Stade 1	Macroanévrismes, exsudation, neurorétinite et vascularite rétinienne
Stade 2	Non-perfusion capillaire en FA
Stade 3	Néovascularisation papillaire/rétinienne et/ou HDV
Stade 4	Rubéose irienne
Stade 5	Glaucome néovasculaire

Traitement suivant les cas (pas de consensus):

- Corticoïdes +/- IS
- PPR sur les zones non perfusées+++ (→ ↓MA)
- IVT anti-VEGF
- V3V+endolaser

Vascularite rétinienne non infectieuse

MALADIE DE SYSTÈME

3

Vascularite veineuse bilatérale non occlusive

Homme
antillais
50 ans

Granulome papillaire +
Vascularite veineuse

SARCOIDOSE^N

Sarcoidose

Segmental and/or nodular periphlebitis ($\pm$ cire de bougie)

5

Homme 45 ans,
Sarcoïdose multiviscérale depuis 10 ans dont atteinte neurologique, traitée par Infliximab.
Sarcoïdose Contrôlée. Pas d'examen ophtalmo depuis des années
AV 9/10 OD et 8/10OG

Images Dr Faudi

Images Dr Faudi

- Néovaisseau pré-rétinien sur ischémie
- Séquelles d'une Vascularite occlusive liée à la sarcoïdose
- Traitement PPR sur territoire d'ischémie
- Diagnostics différentiels éliminés : sténose TSA, drépanocytose

Rétinopathie proliférante sur sarcoïdose: liée à l'ischémie rétinienne
→ néovaisseaux rétiniens, péripapillaires voir iriens

Proliferative Sarcoid Retinopathy +, ++

Jay S. Duker MD, Gary C. Brown MD, J. Arch McNamara MD

Duker et al;
Dyer et al, Cureus 2016

Uvéite intermédiaire puis vascularite occlusive sur Maladie de Behçet

En janvier: vascularite occlusive => Bolus SMD

À M1

Vascularite en optique adaptative

Uvéite intermédiaire, $t=0$, pas d'occlusion

Janvier vascularite occlusive

Janvier vascularite occlusive

Images Pr Paques

M1 après les bolus

M2 après les bolus

High-Resolution Imaging of Retinal Vasculitis by Flood Illumination Adaptive Optics Ophthalmoscopy: A Follow-up Study

Marie-Hélène Errera, Marthe Laguarrigue, Florence Rossant, Edouard Koch,
Céline Chaumette, Christine Fardeau, Mark Westcott, José-Alain Sahel,
Bahram Bodaghi, Jonathan Benesty & Michel Paques *Ocular Immunology and Inflammation*, 2019

Retinal vasculitis was identified by the presence of typical vascular sheathing and/or by foci of fluorescein leakage

N=12

66% corrélation entre l'engainement périvasculaire sur l'OA et la diffusion vasculaire en fluorescéine

58% l'engainement périvasculaire dans des Nouvelles aires non visibles en rétino-photo ou FFA

FIGURE 2. Patient 3 (birdshot chorioretinopathy). Left, FA at baseline: note the fluorescein leakage in the area enclosed by the square. Right, AOO imaging showing perivenous sheathing (arrowheads) and focal narrowing (asterisk).

- Un homme de 32 ans consulte pour baisse acuité visuelle brutale œil droit à 1/10
- Présence d'une uvéite antérieure non granulomateuse

Occlusion d'une veine avec
vascularite et atteinte maculaire

Tugal-Tutkkun et al: Behcet : le + svt: 60% (n=880) panU G- avec vascularite occlusive veineuse , chez 75% Hommes jeunes, inaugurale dans 10-20%, bilatéralisation en <3 ans

Maladie de Behçet

Multiplés occlusions de veines rétinienne et capillaires, irrégularité paroi vasculaire séquellaire en temporal
IRM cérébrale: thrombophlébite de toute la veine jugulaire

Evolution sous traitement

À 1 mois

Behçet

Diapo Pr Bodaghi

Fluo
00:00:20

Fluo
00:01:48

Fluo
00:03:56

D. Bodaghi

Syndrome de Susac

- Encéphalopathie / surdit-vertiges / occlusions artrielles rtiniennes

Lsions corps calleux, pont et pri ventriculaire

Hyperfluorescence Art
Occlusions Art

8

Femme 35 ans BAV bilatérale sur ischémie maculaire à
Découverte récente d'un lupus cutané-articulaire, AAN+

LUPUS

AV 1/10 OD et CLD OG

Rétinopathie lupique: 3-30% des patients.

Directement corrélée à l'activité du LED sur le plan général

Pronostic visuel sombre: 80% de BAV profonde dont 5% < 1/10 et 40% néovaisseau rétinien voir DR tractionnel

Traitement intense
anti-inflammatoire (CT
+ IS) contre lupus
+ PPR contre ischémie

EVOLUTION

INITIALEMENT

À 4 MOIS

À 6 MOIS

Après la résolution de la

vascularite: Reperfusion rétablie dans les zones de transition où les capillaires restent intacts mais ne sont pas activement perfusés .

Décrit dans vascularites rétiniennes occlusives sur Behcet, cryoglobulinémie ou lupus

a	b
c	d
e	f

Bomar et al, JAMA 2016

G Desurmont, A Toutée, B Bodaghi JFO

Angéite givrée

- Idiopathique
- Ilr à une infection (virus),
une inflammation
(sarcoïdose, lupus, behçet)
ou une hémopathie

Uvéite intermédiaire : Capillaropathie

- MAI: sarcoïdose, Behçet, SEP
- Infectieux: tuberculose, syphilis, lyme, toxocarose (unilat)
- Autre: lymphome

Conclusions

- **Vascularites rétiniennes** = Atteintes potentiellement sévères et sources de complications
- Bilan étiologique initial indispensable orienté par la clinique
- Eliminer les pseudo-VR

Je vous remercie de votre attention